

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

ATENOLOLO EG 50 mg compresse ATENOLOLO EG 100 mg compresse

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è ATENOLOLO EG e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere ATENOLOLO EG
3. Come prendere ATENOLOLO EG
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ATENOLOLO EG
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è ATENOLOLO EG e a cosa serve

Questo medicinale contiene il principio attivo atenololo, appartenente ad un gruppo di medicinali chiamati beta-bloccanti, che agiscono rallentando il battito cardiaco e facendo in modo che il cuore batta con meno forza.

ATENOLOLO EG è indicato per:

- il trattamento della pressione del sangue alta (ipertensione);
- il trattamento del dolore toracico causato da problemi al cuore (angina pectoris cronicamente stabile o angina pectoris instabile);
- il trattamento di alcuni tipi di alterazioni del battito cardiaco (tachiaritmie).

2. Cosa deve sapere prima di prendere ATENOLOLO EG

Non prenda ATENOLOLO EG

- se è allergico all'atenololo e altri medicinali simili o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha un battito del cuore molto lento (bradicardia);
- se ha un grave problema cardiaco noto come shock cardiogeno, che si verifica quando il suo cuore non pompa una sufficiente quantità di sangue in tutto il corpo;
- se ha la pressione del sangue bassa (ipotensione);
- se il medico le ha detto che il livello di acidità del suo sangue è più elevato del normale (acidosi metabolica);
- se ha gravi disturbi della circolazione del sangue negli arti (circolazione arteriosa periferica);
- se ha un difetto della conduzione del cuore (blocco atrioventricolare di grado superiore al 1°, blocco seno-atriale, sindrome del nodo al seno);
- se la funzionalità del suo cuore è insufficiente e non viene controllata da una terapia adeguata (insufficienza cardiaca);
- se è in trattamento con medicinali, iniettati direttamente in vena, chiamati calcio antagonisti, ad esempio verapamil (utilizzato per il trattamento della pressione sanguigna alta) o diltiazem (utilizzato per il

- trattamento della pressione sanguigna alta, dell'angina pectoris, e altri disturbi del cuore), o medicinali usati per normalizzare il ritmo del cuore, come la disopiramide;
- se sta assumendo medicinali usati per il trattamento della depressione (MAO-inibitori ad eccezione dei MAO-beta-bloccanti);
 - se ha problemi respiratori (ad esempio asma bronchiale).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere ATENOLOLO EG.

Faccia particolare attenzione e consulti il medico prima di prendere questo medicinale:

- se ha un tumore della ghiandola surrenale, chiamato feocromocitoma;
- se ha problemi al cuore (blocco atrioventricolare di 1° grado);
- se ha il diabete che non è ben controllato con la terapia, per evitare il rischio di gravi stati di abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue (ipoglicemia);
- se in passato ha sofferto di gravi reazioni allergiche (reazioni anafilattiche);
- se ha gravi problemi ai reni (grave compromissione renale);
- se è in gravidanza e se sta allattando al seno;
- se ha una predisposizione ad una malattia della pelle chiamata psoriasi.

Durante il trattamento con questo medicinale il medico le prescriverà esami di controllo della funzionalità del fegato e dei reni.

Avverta il medico se nota la comparsa di disturbi della pelle caratterizzati dalla presenza di macchie rosse e/o sanguinamento (porpora trombocitopenica e non trombocitopenica).

Se svolge attività sportiva: l'uso di questo medicinale senza necessità terapeutica costituisce doping e può comunque determinare positività ai test antidoping.

Bambini

A causa della mancanza di dati, l'uso di ATENOLOLO EG nei bambini non è raccomandato.

Altri medicinali e ATENOLOLO EG

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In particolare informi il medico se sta assumendo:

- medicinali usati per abbassare la pressione sanguigna come verapamil e diltiazem;
- medicinali utilizzati per il trattamento delle alterazioni del battito del cuore (reserpina, alfa-metildopa, guanfacina, glicosidi digitalici);
- clonidina, un medicinale utilizzato per il trattamento della pressione alta. Se i due farmaci vengono somministrati contemporaneamente, e la terapia deve essere sospesa, la clonidina deve essere sospesa parecchi giorni dopo la sospensione di ATENOLOLO EG;
- medicinali utilizzati per il trattamento della depressione (MAO inibitori, ad eccezione degli inibitori MAO-B);
- medicinali utilizzati per il trattamento delle alterazioni del battito del cuore (antiaritmici di classe I quali disopiramide, chinidina) e amiodarone;
- medicinali utilizzati in caso di infiammazioni e per alleviare il dolore (indometacina);
- medicinali utilizzati per indurre l'anestesia o per rilassare i muscoli (miorilassanti periferici); se deve sottoporsi ad un intervento chirurgico, avvisi l'anestesista che sta assumendo ATENOLOLO EG;
- medicinali utilizzati per il trattamento del diabete (insulina e antidiabetici orali);
- medicinali utilizzati per il trattamento della pressione alta (ad esempio nifedipina);
- medicinali che stimolano il cuore, come l'epinefrina o la norepinefrina;
- medicinali usati per trattare la depressione, come gli antidepressivi triciclici;
- medicinali usati per trattare le convulsioni (barbiturici);
- medicinali usati per il trattamento dei disturbi della mente, come le psicosi (fenotiazine);
- altri medicinali per il controllo della pressione del sangue (vasodilatatori, antiipertensivi, diuretici).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Dal momento che non può essere esclusa la possibilità di un danno al feto, se è in gravidanza, se sta pianificando una gravidanza o se sta allattando al seno, l'uso di ATENOLOLO EG richiede un'attenta valutazione dei rischi.

Se è in gravidanza e sta assumendo questo medicinale, il trattamento deve essere interrotto 24-48 ore prima della data prevista del parto.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Possono verificarsi occasionalmente vertigini o sensazione di stanchezza. Se ciò dovesse verificarsi, non guidi veicoli e non usi macchinari.

ATENOLOLO EG contiene lattosio

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere ATENOLOLO EG

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Prenda le compresse con un po' di liquido prima dei pasti. Il medico regolerà la dose in base alle sue condizioni. Si consiglia di iniziare la terapia con la dose più bassa, soprattutto nei pazienti anziani. Se necessario, il medico potrà aumentare la dose in modo graduale. La massima efficacia si ottiene dopo 1-2 settimane di terapia.

Trattamento della pressione del sangue alta (ipertensione)

La dose raccomandata è di 50 mg al giorno. Tale dose può essere aumentata fino a 100 mg al giorno. Per abbassare ulteriormente la sua pressione sanguigna, a seconda delle sue condizioni di salute, il medico potrà prescrivere di prendere atenololo in associazione ad un altro medicinale per la pressione alta (come un diuretico).

Trattamento del dolore toracico causato da problemi al cuore (angina pectoris cronicamente stabile o angina pectoris instabile)

La dose raccomandata è di 1 compressa da 100 mg 1 volta al giorno o di 1 compressa da 50 mg 2 volte al giorno.

Trattamento di alcuni tipi di alterazioni del battito cardiaco (tachiaritmie)

La dose raccomandata è di 50 mg o 100 mg al giorno.

Se durante il trattamento con ATENOLOLO EG la frequenza cardiaca e/o la pressione sanguigna diminuiscono troppo, oppure si verifica qualsiasi altra complicazione che renda necessario un intervento terapeutico, il medico le dirà di interrompere il trattamento con ATENOLOLO EG.

Uso negli anziani

Può essere necessario ridurre la dose, particolarmente se la funzionalità dei reni è compromessa.

Uso nei bambini

Non c'è esperienza sull'uso dell'atenololo nei bambini, pertanto ATENOLOLO EG non è raccomandato nei bambini.

Uso nei pazienti con compromissione della funzionalità renale

Se soffre di grave compromissione della funzionalità renale il medico ridurrà la dose in base alle sue condizioni di salute.

Uso nei pazienti in emodialisi

La dose raccomandata è di 50 mg dopo ogni seduta di filtrazione del sangue (emodialisi).

Se prende più ATENOLOLO EG di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione di una quantità eccessiva di questo medicinale, si rivolga immediatamente al medico o al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino. In caso di assunzione di una dose eccessiva di questo medicinale, i sintomi che può manifestare sono: rallentamento dei battiti del cuore (bradicardia), diminuzione della pressione del sangue (ipotensione), insufficiente funzionalità del cuore (insufficienza cardiaca acuta e shock cardiogeno), difficoltà respiratoria (broncospasmo), vomito, alterazione dello stato di coscienza e convulsioni.

Se dimentica di prendere ATENOLOLO EG

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Assuma la compressa dimenticata appena possibile, a meno che non sia quasi l'ora di prendere quella successiva.

Se interrompe il trattamento con ATENOLOLO EG

Non interrompa il trattamento con questo medicinale senza aver consultato il medico.

È necessario che l'interruzione del trattamento con questo medicinale avvenga in maniera graduale, in quanto una interruzione improvvisa può determinare disturbi della circolazione sanguigna del cuore (cardiopatía ischemica) con peggioramento dell'angina pectoris, aumento eccessivo della pressione del sangue (ipertensione) o problemi al cuore (infarto).

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:

- peggioramento degli attacchi anginosi in pazienti con angina pectoris;
- peggioramento dei sintomi nei pazienti con disturbi della circolazione periferica (compreso i pazienti con sindrome di Raynaud);
- rallentamento dei battiti del cuore (bradicardia);
- sensazione di freddo alle mani e ai piedi;
- pressione del sangue bassa (ipotensione);
- svenimento associato a perdita di coscienza (sincope);
- disturbi della conduzione atrioventricolare;
- deterioramento della funzionalità del cuore in pazienti già affetti da insufficiente funzionalità del cuore (insufficienza cardiaca);
- disturbi del sonno;
- mal di testa;
- allucinazioni o aumentata frequenza del sogno;
- secchezza della bocca;
- disturbi dello stomaco/intestino come nausea, vomito, stitichezza o diarrea;
- reazioni cutanee allergiche, come eritema, prurito, eruzioni cutanee;
- [sindrome lupus-simile \(una malattia in cui il sistema immunitario produce anticorpi che attaccano principalmente la pelle e le articolazioni\) \(frequenza non nota\)](#);
- psoriasi, aggravamento della psoriasi, eruzioni cutanee psoriasiformi;
- debolezza muscolare e crampi;
- infiammazione della mucosa degli occhi (congiuntivite);
- secchezza degli occhi, soprattutto se usa le lenti a contatto;
- peggioramento della difficoltà respiratoria nei pazienti che soffrono o hanno sofferto di asma;
- formicolio alle mani o ai piedi (parestesia);

- stanchezza;
- vertigini;
- sensazione di testa vuota;
- sudorazione;
- depressione;
- peggioramento del diabete o manifestazione del diabete in pazienti con diabete mellito latente;
- abbassamento del livello di zuccheri nel sangue (ipoglicemia), soprattutto dopo digiuno prolungato o attività fisica intensa;
- difficoltà nell'avere o mantenere l'erezione (impotenza) e perdita del desiderio;
- alterazione dei livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ATENOLOLO EG

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "SCAD". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ATENOLOLO EG

- Il principio attivo è atenololo. Ogni compressa contiene 50 mg o 100 mg di atenololo.
- Gli altri componenti sono: amido di mais, lattosio, polividone, sodio laurilsolfato, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Descrizione dell'aspetto di ATENOLOLO EG e contenuto della confezione

ATENOLOLO EG "50 mg compresse": confezione da 50 compresse.

ATENOLOLO EG "100 mg compresse": confezioni da 42 o 50 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

EG S.p.A. Via Pavia, 6 – 20136 Milano

Produttore

Cosmo S.p.A. Via C. Colombo, 1 20020 LAINATE (Milano)

DOPPEL Farmaceutici S.r.l. Via Volturmo, 48 Quinto De' Stampi, Rozzano (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 24 Febbraio 2016

