

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

BACAMPICILLINA EG 1200 mg compresse rivestite con film

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è BACAMPICILLINA EG e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere BACAMPICILLINA EG
3. Come prendere BACAMPICILLINA EG
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare BACAMPICILLINA EG
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è BACAMPICILLINA EG e a cosa serve

Questo medicinale contiene il principio attivo bacampicillina appartenente alla classe dei medicinali antibiotici del gruppo delle penicilline, utilizzati per il trattamento delle infezioni causate da vari tipi di batteri (batteri Gram-positivi e gram-negativi).

BACAMPICILLINA EG è indicato per il trattamento di

- **infezioni delle vie respiratorie inferiori:** infezioni dei bronchi (bronchiti) e polmoni (polmoniti) causate da batteri sensibili di pneumococco, streptococco, stafilococco non penicillinasi produttore e *H. influenzae*;
- **infezioni delle vie respiratorie superiori:** infezioni della faringe (faringite), tonsille (tonsillite), orecchio (otite media), naso (sinusite), laringe (laringite, infezioni dell'epiglottide) causate da batteri sensibili di Streptococco beta-emolitico, Stafilococco non penicillinasi produttore, pneumococco e *H. influenzae*;
- **infezioni delle vie urinarie e genitali:** infiammazioni della vescica (cistite) acuta e cronica, del rene e delle vie urinarie superiori (pielonefrite), delle vie urinarie inferiori (uretrite), di una ghiandola dell'apparato genitale maschile chiamata prostata (prostatite) causate da batteri sensibili di *E. coli*, Enterococco, Stafilococco non penicillinasi produttore, *P. mirabilis* e *N. gonorrhoeae*;
- **infezioni della pelle e dei tessuti molli** (impetigine, erisipela, piodermite), ascessi e ferite traumatiche postoperatorie causate da batteri sensibili di Stafilococco non penicillinasi produttore, Streptococco ed Enterococco;
- **infezioni dell'intestino** causate da batteri sensibili di *Shigella* e *Salmonella*, inclusa la *S. typhosa*;
- **infezioni della bocca e dei denti**, sia acute che croniche causate da germi sensibili.

2. Cosa deve sapere prima di prendere BACAMPICILLINA EG

Non prenda BACAMPICILLINA EG

- se è allergico alla bacampicillina, alla penicillina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se è allergico ai medicinali antibiotici appartenenti al gruppo delle cefalosporine;

- se sta assumendo disulfiram, un medicinale utilizzato per il trattamento della dipendenza da alcol (alcolismo);
- se è affetto da una malattia infettiva causata da un virus e chiamata “mononucleosi infettiva” (Vedere il paragrafo “Avvertenze e precauzioni”).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere BACAMPICILLINA EG.

Prima di prescrivere questo medicinale, il medico verificherà se in passato ha sofferto di reazioni di ipersensibilità alle penicilline, alle cefalosporine e ad altre sostanze allergizzanti.

Sospenda il trattamento con questo medicinale e informi il medico che, se necessario, stabilirà una terapia adeguata, nei seguenti casi:

- se si verifica una reazione allergica. Durante la terapia con medicinali simili a BACAMPICILLINA EG (penicilline), sono state segnalate gravi reazioni di ipersensibilità, a volte anche fatali (anafilassi). Se ha sofferto di allergia alle penicilline o è un soggetto predisposto alle allergie (ipersensibilità a sostanze allergizzanti multiple) è più probabile che si verifichi una nuova reazione di ipersensibilità in seguito alla somministrazione di questo medicinale. Persone che hanno sofferto di ipersensibilità alla penicillina, hanno presentato gravi reazioni in seguito all'assunzione di altri antibiotici (cefalosporine);
- se si sovrappongono nuove infezioni a quelle in corso. Come per tutti gli antibiotici, è necessario un controllo costante sulla comparsa di ulteriori infezioni dovute a germi verso i quali questo medicinale non è efficace (germi non sensibili compresi i funghi).

In caso di trattamento prolungato il suo medico potrà sottoporla a controlli periodici della funzionalità del fegato e dei reni e ad analisi del sangue.

Se soffre di mononucleosi non prenda antibiotici della famiglia dell'ampicillina come BACAMPICILLINA EG perché possono causare una reazione della pelle (esantema) (vedere il paragrafo “Non prenda BACAMPICILLINA EG”).

Il trattamento con questo medicinale può dare un risultato di falso positivo ai test per la ricerca della presenza di zuccheri nelle urine (glicosuria). Se deve eseguire questo controllo informi prima il medico.

Altri medicinali e BACAMPICILLINA EG

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Prenda questo medicinale con cautela se sta assumendo medicinali utilizzati per abbassare i livelli di acido urico nel sangue (allopurinolo). L'impiego contemporaneo di allopurinolo ed ampicilline aumenta notevolmente la percentuale di reazioni cutanee tipo esantema rispetto ai pazienti trattati con sola ampicillina.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Prenda questo medicinale durante la gravidanza solo in caso di assoluta necessità e sotto il controllo del medico in quanto si può verificare una riduzione reversibile dei livelli di alcuni ormoni nel sangue (dell'estriolo coniugato totale, dell'estriolo glucuronato, dell'estrone coniugato e dell'estradiolo).

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

BACAMPICILLINA EG contiene lattosio

Questo medicinale contiene lattosio, un tipo di zucchero. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere BACAMPICILLINA EG

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata negli adulti e nei bambini di età superiore ai 7 anni è 1 compressa ogni 12 ore (salvo diversa prescrizione del medico).

Può assumere questo medicinale anche a stomaco pieno, in quanto la presenza di cibo non modifica l'assorbimento dell'antibiotico.

Se prende più BACAMPICILLINA EG di quanto deve

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio da questo medicinale.

In caso di ingestione/assunzione di una dose eccessiva di questo medicinale avverta immediatamente il medico o si rivolga al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino.

Se dimentica di prendere BACAMPICILLINA EG

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se interrompe il trattamento con BACAMPICILLINA EG

Continui a prendere BACAMPICILLINA EG per tutto il periodo che le ha indicato il medico, anche se si sente meglio. È necessario rispettare la durata del trattamento per combattere l'infezione. Se alcuni batteri sopravvivono, possono causare il ritorno dell'infezione.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati sono stati associati all'uso di penicilline ad ampio spettro per via orale:

- infiammazione della lingua (glossite);
- infiammazione della bocca (stomatite);
- mal di stomaco (dolore epigastrico);
- nausea;
- vomito;
- diarrea;
- infiammazione dell'intestino (colite pseudomembranosa);
- reazioni della pelle quali eruzione cutanea, eritemi maculo-papulosi, orticaria, eritema multiforme, dermatite esfoliativa;
- reazione allergica (anafilassi). Tali reazioni si verificano più facilmente in soggetti che hanno già manifestato allergia, asma, febbre da fieno, orticaria (vedere paragrafo "Avvertenze e precauzioni");
- alterazione dell'attività del fegato (aumento dei livelli della SGOT);
- infiammazione dei reni (nefrite interstiziale acuta) in seguito a somministrazione di penicilline diverse da BACAMPICILLINA EG.

Questo medicinale può causare i seguenti effetti indesiderati a carico del sangue, ritenuti fenomeni di ipersensibilità e che di solito scompaiono con la sospensione del trattamento:

- diminuzione del livello dei globuli rossi (anemia);
- diminuzione dei livelli delle piastrine nel sangue (trombocitopenia);
- disturbo della pelle associato a sanguinamento e dovuto alla diminuzione delle piastrine (porpora trombocitopenica);
- aumento dei livelli dei globuli bianchi nel sangue (eosinofilia);
- diminuzione dei livelli dei globuli bianchi nel sangue (leucopenia ed agranulocitosi).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare BACAMPICILLINA EG

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene BACAMPICILLINA EG

- Il principio attivo è bacampicillina cloridrato. Ogni compressa contiene 1200 mg di bacampicillina cloridrato.
- Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, titanio diossido, polietilenglicole 6000, ipromellosa, lattosio.

Descrizione dell'aspetto di BACAMPICILLINA EG e contenuto della confezione

Confezione da 12 compresse rivestite con film.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

EG S.p.A. – Via Pavia, 6 – 20136 Milano

Produttore

BIOPHARMA S.r.l. - Via delle Gerbere, 22/30 (loc. S. Palomba), 00134 Roma

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 21 Dicembre 2016