

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

LEVOCETIRIZINA EG 5 mg compresse rivestite con film Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di **prendere** questo medicinale **perché contiene importanti informazioni per lei**.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto **soltanto** per lei. Non lo dia ad altre **persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso**.
- Se **si manifesta un** qualsiasi effetto indesiderato **compresi quelli** non elencati in questo foglio **si rivolga al medico o al farmacista**. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Levocetirizina EG e a che cosa serve
2. **Cosa deve sapere** prima di prendere Levocetirizina EG
3. Come prendere Levocetirizina EG
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Levocetirizina EG
6. **Contenuto della confezione e altre informazioni**

1. **Che cos'è Levocetirizina EG e a che cosa serve**

Il **principio attivo di Levocetirizina EG è levocetirizina dicloridrato, che** è un medicinale antiallergico. È usato per trattare i sintomi associati alle condizioni allergiche, come per esempio:

- febbre da fieno;
- allergie perenni come quelle alla polvere o al pelo animale;
- orticaria cronica.

2. **Cosa deve sapere prima di prendere Levocetirizina EG**

NON prenda Levocetirizina EG

- se è **allergico alla levocetirizina, a qualsiasi altra sostanza analoga o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale** (elencati al paragrafo 6);
- se è affetto da **grave insufficienza renale** (clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Levocetirizina EG

- se soffre di epilessia o se è a rischio di convulsioni per qualsiasi altro motivo. Consulti il medico;
- se soffre di insufficienza renale. **Potrebbe** richiedere un dosaggio più basso e deve discutere la sua condizione con il medico.

Bambini

Levocetirizina EG non è raccomandato nei bambini sotto i 6 anni poiché le compresse rivestite **con film** attualmente disponibili non consentono un adattamento della dose.

Altri medicinali e Levocetirizina EG

Gli effetti di altri **medicinali** possono essere influenzati da Levocetirizina **EG** oppure influenzare a loro volta gli effetti di Levocetirizina **EG**.

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha **recentemente** assunto o **potrebbe assumere** qualsiasi altro medicinale.

Levocetirizina EG con cibi ,bevande e alcool

Levocetirizina **EG** può essere presa **con o senza** cibo.

L'assunzione di Levocetirizina **EG** contemporaneamente ad **alcool** richiede prudenza. Nei pazienti sensibili l'effetto dell'alcool può essere maggiore o diverso da quanto atteso.

Gravidanza e allattamento

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza d'uso di **Levocetirizina EG** durante la gravidanza o l'allattamento.

Se è **in stato di** gravidanza o sta allattando al seno **deve prendere Levocetirizina EG solo** se i benefici superano chiaramente i possibili rischi. La decisione spetta al medico.

Se è **in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno**, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere **questo** medicinale.

Guida di veicoli ed utilizzo di macchinari

In alcuni pazienti **Levocetirizina EG** può causare sonnolenza, stanchezza e spossatezza. Se accusa uno qualsiasi di questi sintomi, si astenga dalla guida e dall'utilizzo di qualsiasi macchinario.

Levocetirizina EG 5 mg contiene lattosio

Se il medico Le ha diagnosticato un'**intolleranza ad alcuni zuccheri**, **lo contatti prima di prendere questo medicinale**.

3. Come prendere Levocetirizina EG

Prenda **questo medicinale** seguendo **sempre esattamente** le **istruzioni** del medico. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La compressa va deglutita **intera**, con acqua o altro liquido.

La dose **raccomandata** per adulti e bambini dai 6 anni di età è **una compressa al giorno**.

Uso nei bambini

I bambini sotto i 6 anni di età non devono prendere Levocetirizina EG.

Se è affetto da **insufficienza renale** da lieve a moderata, il medico può prescrivere una dose più bassa a seconda della gravità della malattia renale.

La durata del trattamento dipende dal tipo, dalla durata e dal decorso dei disturbi. Il medico o il farmacista stabiliranno la durata del trattamento.

Se prende più Levocetirizina EG di quanto deve

Se ha preso più **Levocetirizina EG** di quanto deve, può sperimentare i seguenti sintomi: confusione, diarrea, capogiri, affaticamento, mal di testa, malessere, dilatazione delle pupille, prurito, irrequietezza, soppore, sonnolenza, accelerazione del battito cardiaco, tremore e difficoltà nella minzione. Contatti immediatamente il medico o il farmacista che possono praticarle una lavanda gastrica o adottare altre misure per alleviare i sintomi.

Se dimentica di prendere Levocetirizina EG

Non prenda una doppia dose per compensare **la** dimenticanza **della** dose. Salti la dose dimenticata e prenda la successiva al solito orario.

Se interrompe il trattamento con Levocetirizina EG

L'interruzione precoce del trattamento con Levocetirizina EG non **dovrebbe** provocare alcun effetto indesiderato. I sintomi per i quali ha preso **Levocetirizina EG** possono tuttavia ricomparire.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo **medicinale**, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali **questo medicinale** può causare effetti indesiderati **sebbene** non tutte le persone li manifestino.

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10):

- sonnolenza;
- capogiri;
- mal di testa;
- infiammazione alla gola;
- dolore addominale;
- secchezza **della bocca**;

- malessere;
- stanchezza.

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100):

- sensazione di formicolio o intorpidimento della pelle;
- diarrea;
- eruzioni cutanee;
- prurito;
- senso di debolezza;
- senso di malessere;
- agitazione.

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1000):

- accelerazione del battito cardiaco;
- convulsioni (attacchi);
- disturbi dei movimenti;
- orticaria;
- gonfiore della pelle;
- ipersensibilità (reazione allergica);
- anomalie della funzionalità epatica;
- aumento ponderale;
- aggressività;
- confusione;
- depressione;
- allucinazioni;
- difficoltà a dormire.

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000):

- riduzione delle piastrine, con aumento del rischio di emorragie o ecchimosi;
- alterazione o riduzione del senso del gusto;
- svenimenti;
- visione offuscata;
- dolore durante la minzione;
- enuresi notturna (tendenza a bagnare il letto di notte);
- gravi reazioni allergiche che possono causare il rigonfiamento del viso o della gola;
- reazioni cutanee locali;
- gravi reazioni allergiche, che possono causare difficoltà di respirazione o capogiri;
- tremore;
- disturbi muscolari;
- movimenti spasmodici;
- movimenti circolari degli occhi;
- tic.

Effetti indesiderati ulteriori nei bambini

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10)

- gonfiore ed irritazione del naso.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Levocetirizina EG

Tenere [questo medicinale](#) fuori dalla [vista](#) e dalla [portata](#) dei bambini.

Non usi [questo medicinale](#) dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo la dicitura SCAD. Le prime due cifre indicano il mese; le ultime quattro l'anno. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno [di quel](#) mese.

Conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dall'umidità.

[Non getti alcun medicinale](#) nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. **Contenuto della confezione e altre informazioni**

Cosa contiene Levocetirizina EG

- Il principio attivo è levocetirizina ([come dicloridrato](#)). Ogni compressa contiene 5 mg di levocetirizina dicloridrato equivalenti a 4,2 mg di levocetirizina.
- Gli [altri componenti](#) sono cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato (nucleo) e ipromellosa ([E464](#)), titanio diossido ([E171](#)) e macrogol 400 (rivestimento).

Descrizione dell'aspetto di Levocetirizina EG e contenuto della confezione

Compresse rivestite con film di colore da bianco a biancastro, ovali, biconvesse con "L9CZ" impresso su di un lato e "5" impresso sull'altro.

Sono disponibili confezioni di blister contenenti 10, 14, 20, 28, 40, 50, 60, [80](#) o 100 compresse ciascuna e [blister monodose contenenti 30x1 compresse](#).

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

EG S.p.A. Via Pavia, 6 – 20136 Milano

Produttori

Synthon BV, Microweg 22 6545 CM Nijmegen (Olanda)

Synthon Hispania S.L., Castelló 1 Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat (Spagna)

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18 61118 Bad Vilbel (Germania)

N.V. Eurogenerics S.A., Heizel Esplanade Heysel b 22 1020 Brussel/Bruxelles (Belgio)

LAMP SAN PROSPERO S.p.A., Via della Pace 25/A 41030 San Prospero (Modena – Italia)

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road Clonmel, Co. Tipperary (Irlanda)

Genus Pharmaceuticals, Park View House 65 London Road Newbury Berkshire RG141JN (Regno Unito)

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dell'EEA con le seguenti denominazioni:

Lussemburgo: Levocetirizine EG 5 mg, tabletten

Belgio : Levocetirizine EG 5 mg, tabletten

Francia: Levocetirizine EG 5 mg, comprimè

Germania: Levocetirizin STADA 5 mg, filmtabletten

Irlanda: Rinozal 5 mg film coated tablets

Italia: Levocetirizina EG 5 mg compresse rivestite con film

Questo foglio illustrativo è stato [aggiornato il 29 Aprile 2015](#)