

## FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

### **LETROZOLO EG 2,5 mg compresse rivestite con film**

Medicinale equivalente

**Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

#### **Contenuto di questo foglio**

1. Che cos'è Letrozolo EG e a cosa serve
2. Che cosa deve sapere prima di prendere Letrozolo EG
3. Come prendere Letrozolo EG
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Letrozolo EG
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### **1. Che cos'è Letrozolo EG e a cosa serve**

##### **Che cos'è Letrozolo EG e come agisce**

Letrozolo EG contiene una sostanza attiva chiamata letrozolo. Appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati inibitori dell'aromatasi. È un trattamento ormonale (o "endocrino") del tumore della mammella. La crescita del tumore della mammella è frequentemente stimolata dagli estrogeni che sono ormoni sessuali femminili. Letrozolo EG riduce la quantità di estrogeni mediante il blocco di un enzima ("aromatasi") che è coinvolto nella produzione di estrogeni e pertanto può bloccare la crescita di tumori al seno che hanno bisogno di estrogeni per crescere. Come conseguenza si rallenta o si interrompe la crescita delle cellule tumorali e/o la loro diffusione verso altre parti del corpo.

##### **Per cosa viene utilizzato Letrozolo EG**

Letrozolo EG è utilizzato per il trattamento del tumore della mammella in donne in menopausa cioè che non hanno più il ciclo mestruale.

È usato per prevenire il ripresentarsi del tumore della mammella. Può essere utilizzato come un primo trattamento prima di un intervento chirurgico al seno nel caso in cui l'intervento immediato non sia possibile o come primo trattamento dopo intervento chirurgico al seno o dopo il trattamento di cinque anni con tamoxifene. Letrozolo EG è anche utilizzato per prevenire la diffusione del tumore della mammella in altre parti del corpo in pazienti con tumore della mammella in uno stadio avanzato.

Se ha una qualsiasi domanda su come agisce Letrozolo EG o perché le è stato prescritto questo medicinale, si rivolga al medico.

#### **2. Cosa deve sapere prima di prendere Letrozolo EG**

Segua attentamente le istruzioni del medico. Esse potrebbero essere diverse dalle informazioni generali riportate in questo foglio.

##### **Non prenda Letrozolo EG**

- se è allergico al letrozolo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha ancora il ciclo mestruale, cioè se non è ancora in menopausa;
- se è in gravidanza;
- se sta allattando al seno.

Se una di queste condizioni la riguarda, **non prenda questo medicinale ed informi il medico.**

#### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Letrozolo EG

- se ha una grave malattia renale;
- se ha una grave malattia epatica;
- se ha una storia di osteoporosi o di fratture ossee (vedere anche "Monitoraggio del trattamento con Letrozolo EG nel paragrafo 3).

Se una di queste condizioni la riguarda, **informi il medico**. Questo verrà tenuto in considerazione dal medico durante il trattamento con Letrozolo EG.

#### **Bambini e adolescenti (età inferiore a 18 anni)**

I bambini e gli adolescenti non devono usare questo medicinale.

#### **Anziani (età pari o superiore a 65 anni)**

Le donne di età pari o superiore a 65 anni possono usare questo medicinale alla stessa dose prevista per le donne adulte.

#### **Altri medicinali e Letrozolo EG**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

#### **Gravidanza, allattamento e fertilità**

- Deve assumere Letrozolo EG solo quando è entrata in menopausa. Tuttavia, il medico discuterà con lei la necessità di usare un efficace sistema contraccettivo in quanto potrebbe potenzialmente essere ancora a rischio di iniziare una gravidanza durante il trattamento con Letrozolo EG.
- Non deve prendere Letrozolo EG se è in stato di gravidanza o sta allattando perché può essere dannoso per il bambino.

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Se ha una sensazione di vertigini, di stanchezza, di sonnolenza o di malessere generale, non guidi e non utilizzi macchinari finché non si sente di nuovo bene.

#### **Letrozolo EG contiene lattosio**

Letrozolo EG contiene lattosio (zucchero del latte). Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

### **3. Come prendere Letrozolo EG**

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di una compressa di Letrozolo EG da prendere una volta al giorno. Prendere Letrozolo EG ogni giorno alla stessa ora la aiuterà a ricordare quando prendere la compressa.

La compressa può essere assunta con o senza cibo e deve essere deglutita intera con un bicchiere d'acqua o di un'altra bevanda.

#### **Per quanto tempo prendere Letrozolo EG**

Continui a prendere Letrozolo EG ogni giorno per la durata che il medico le ha detto. Può aver bisogno di prenderlo per mesi o anche per anni. Se ha domande in merito a quanto tempo prendere Letrozolo EG, parli con il medico.

#### **Monitoraggio durante il trattamento con Letrozolo EG**

Deve prendere questo medicinale sotto stretto controllo del medico. Il medico controllerà regolarmente il suo stato di salute per verificare che il trattamento abbia il giusto effetto.

Letrozolo EG può causare fragilità o perdita della massa ossea (osteoporosi) per la diminuzione di estrogeni nel corpo. Il medico può decidere di effettuare la misurazione della densità ossea (un modo per controllare l'osteoporosi) prima, durante e dopo il trattamento.

### **Se prende più Letrozolo EG di quanto deve**

Se ha preso troppo Letrozolo EG, o se qualche altra persona ha preso accidentalmente le sue compresse, contatti immediatamente il medico o l'ospedale per un consiglio. Mostri loro la confezione di compresse. Potrebbe essere necessario un trattamento medico.

### **Se dimentica di prendere Letrozolo EG**

- Se è vicino il momento di prendere la dose successiva (per esempio entro 2 o 3 ore), salti la dose che ha dimenticato e prenda la dose successiva quando è previsto che la prenda.
- Altrimenti, prenda la dose appena si ricorda e quindi prenda la compressa successiva come farebbe normalmente.
- Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

### **Se interrompe il trattamento con Letrozolo EG**

Non interrompa l'assunzione di Letrozolo EG a meno che non le venga detto dal medico. Vedere anche il paragrafo riportato sopra "Per quanto tempo prendere Letrozolo EG.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

La maggior parte degli effetti indesiderati è da lieve a moderato e di solito scompaiono dopo un periodo di trattamento compreso tra pochi giorni e poche settimane.

Alcuni di questi effetti indesiderati come vampate di calore, perdita di capelli o sanguinamento vaginale, possono essere causati dalla mancanza di estrogeni nel corpo.

Non si preoccupi per questo elenco di possibili effetti indesiderati. Potrebbe non esserne soggetta.

### **Alcuni effetti indesiderati possono essere gravi:**

**Effetti rari o non comuni** (cioè possono interessare tra 1 e 100 persone ogni 10.000):

- Debolezza, paralisi o perdita di sensibilità in una qualsiasi altra parte del corpo (in particolare braccio o gamba), perdita di coordinazione, nausea, o difficoltà nel parlare o di respirazione (sintomo di una patologia cerebrale, ad esempio ictus).
- Improvviso dolore al torace con senso di oppressione (sintomo di una patologia cardiaca).
- Difficoltà di respirazione, dolore al torace, svenimento, battito cardiaco accelerato, colorazione bluastra della pelle, o dolore improvviso al braccio, alla gamba o al piede (sintomi di una possibile formazione di un coagulo di sangue).
- Gonfiore ed arrossamento in corrispondenza di una vena che risulta estremamente sensibile e anche dolorosa al tatto.
- Febbre alta, brividi o ulcerazione della bocca causate da infezioni (mancanza di globuli bianchi).
- Visione offuscata in modo grave e persistente.

**Se uno di questi effetti si manifesta, informi il medico immediatamente.**

Deve informare immediatamente il medico se si manifesta uno dei seguenti sintomi durante il trattamento con Letrozolo EG:

- Gonfiore principalmente del viso e della gola (segni di reazione allergica).
- Pelle ed occhi giallastri, nausea, perdita dell'appetito, urine scure (segni di epatite).
- Eruzione cutanea, pelle arrossata, vesciche alle labbra, occhi o labbra, esfoliazione della pelle, febbre (segni di patologie cutanee).

**Alcuni effetti indesiderati sono molto comuni.** Questi effetti indesiderati possono interessare più di 1 persona su 10.

- Vampate di calore.
- Aumento dei livelli di colesterolo (ipercolesterolemia).
- Affaticamento.
- Aumento della sudorazione.
- Dolore alle ossa e alle giunture (artralgia).

Se uno di questi effetti si manifesta in modo grave, informi il medico.

**Alcuni effetti indesiderati sono comuni.** Questi effetti indesiderati possono interessare fino a 1 persona su 10.

- Eruzione cutanea.
- Mal di testa.
- Capogiri.
- Malessere (di solito sensazione di malessere).
- Patologie gastrointestinali come nausea, vomito, indigestione, stitichezza, diarrea.
- Aumento o perdita dell'appetito.
- Dolore muscolare.
- Fragilità o perdita della massa ossea (osteoporosi), che in alcuni casi porta a fratture ossee (vedere anche "Monitoraggio durante il trattamento con Letrozolo EG" nel paragrafo 3).
- Gonfiore delle braccia, delle mani, dei piedi, delle caviglie (edema).
- Depressione.
- Aumento di peso.
- Perdita dei capelli.
- Aumento della pressione arteriosa (ipertensione).
- Dolore addominale.
- Secchezza della pelle.
- Sanguinamento vaginale.

Se uno di questi effetti si manifesta in modo grave, informi il medico.

**Altri effetti indesiderati sono non comuni.** Questi effetti indesiderati possono interessare fino a 1 persona su 100.

- Patologia del sistema nervoso come ansia, nervosismo, irritabilità, sopore, problemi di memoria, sonnolenza, insonnia.
- Dolore e sensazione di bruciore alle mani e al polso (sindrome del tunnel carpale).
- Compromissione della sensibilità, specialmente al tatto.
- Patologie dell'occhio come visione offuscata, irritazione agli occhi.
- Palpitazioni, battito cardiaco veloce.
- Patologie cutanee come prurito (orticaria).
- Perdite o secchezza vaginale.
- Rigidità articolare (artriti).
- Dolore al seno.
- Febbre.
- Sete, disturbi del gusto, secchezza della bocca.
- Secchezza delle mucose.
- Perdita di peso.
- Infezioni del tratto urinario, aumento della frequenza urinaria.
- Tosse.
- Aumento dei livelli degli enzimi nel fegato.

**Effetti indesiderati con frequenza non nota.** La frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili.

- Dito a scatto, una condizione in cui il dito o il pollice rimane in una posizione piegata.

Se uno di questi effetti si manifesta in modo grave, informi il medico.

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## **5. Come conservare Letrozolo EG**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dall'umidità.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sia sul blister che sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## **6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

### **Cosa contiene Letrozolo EG**

- Il principio attivo è il letrozolo. Ogni compressa contiene 2,5 mg di letrozolo.
- Gli altri componenti sono lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (Tipo A), ipromellosa (6 mPas), idrossipropilcellulosa, magnesio stearato, talco, olio di semi di cotone, ferro ossido giallo (E 172), ferro ossido rosso (E 172), titanio diossido (E 171).

### **Descrizione dell'aspetto di Letrozolo EG e contenuto della confezione**

Le compresse rivestite con film di Letrozolo EG sono rotonde e di colore giallo, con superfici convesse su entrambi i lati. Le compresse sono disponibili in confezioni blister da 10, 30 e 100 compresse.

### **Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio**

EG S.p.A., Via Pavia, 6 – 20136 Milano

### **Produttori**

Haupt Pharma Münster GmbH, Schleebruggenkamp 15, 48159 Münster Germania

[STADApHarm GmbH, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germania](#)

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 – 18, 61118 Bad Vilbel, Germania

Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, 1190 Wien, Austria

Eurogenerics N.V., Heizel Esplanade B22, 1020 Brussels, Belgio

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irlanda

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 21 Marzo 2017**