

FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

CEFIXIMA EG 400 mg compresse rivestite con film

Medicinale equivalente

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è CEFIXIMA EG e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere CEFIXIMA EG
3. Come prendere CEFIXIMA EG
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare CEFIXIMA EG
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. CHE COS'È CEFIXIMA EG E A COSA SERVE

CEFIXIMA EG appartiene a un gruppo di farmaci chiamati cefalosporine, usati per il trattamento delle infezioni di entità da lieve a moderata sostenute da organismi sensibili.

CEFIXIMA EG viene usato per trattare:

- Infezione acuta dell'orecchio medio.
- Infezione acuta della gola dovuta a infezione batterica.
- Infezioni acute non complicate delle vie urinarie (cistite acuta non complicata).
- Gonorrea acuta non complicata.

2. COSA DEVE SAPERE PRIMA DI PRENDERE CEFIXIMA EG

Non prenda CEFIXIMA EG:

- se è allergico alla cefixima o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6). Può manifestarsi una reazione allergica come eruzione cutanea, prurito, difficoltà respiratorie oppure rigonfiamento di viso, labbra, gola o lingua;
- se è allergico ad altre cefalosporine;
- se ha mai avuto una reazione allergica grave alla penicillina o ad altri antibiotici beta-lattamici.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere CEFIXIMA EG.

Comunichi al medico se:

- È allergico alla penicillina o a qualsiasi altro antibiotico beta-lattamico. Non tutte le persone allergiche alle penicilline sono anche allergiche alle cefalosporine. Se tuttavia ha avuto una reazione allergica a qualsiasi penicillina, sia particolarmente prudente. Questo perché Lei potrebbe essere allergico anche a questo farmaco.

I pazienti che sviluppano una grave reazione allergica o anafilassi (grave reazione allergica che provoca difficoltà respiratorie o capogiri) dopo la somministrazione di CEFIXIMA EG, devono sospendere il farmaco e sottoporsi ad adeguato trattamento.

- Le è stato detto che i suoi reni non funzionano adeguatamente. Anche se si sottopone a qualsiasi tipo di trattamento (come la dialisi) per l'insufficienza renale può prendere CEFIXIMA EG ma la dose potrebbe dover essere ridotta (Bambini con problemi renali non devono essere trattati con CEFIXIMA EG).
- Manifesta una diarrea grave o persistente, con possibile presenza di sangue e associata a dolore o crampi allo stomaco. Questi sintomi possono manifestarsi durante o poco dopo la conclusione del trattamento. Si tratta di reazioni avverse rare ma potenzialmente pericolose per la vita. Smetta di prendere CEFIXIMA EG e si metta immediatamente in contatto con il medico. Non prenda farmaci che possono rallentare o bloccare i movimenti intestinali.

Un ciclo di CEFIXIMA EG può temporaneamente aumentare la possibilità che si sviluppino infezioni causate da altri germi resistenti a CEFIXIMA EG. Per esempio può manifestarsi mugugno (un'infezione causata da un lievito chiamato Candida).

Altri medicinali e CEFIXIMA EG

Informi il medico se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. Informi il medico se sta assumendo il seguente medicinale, che potrebbe interagire con CEFIXIMA EG:

- medicinale per terapia anticoagulante (per fluidificare il sangue).

Effetti sugli esami di laboratorio

Se sta per sottoporsi a esami del sangue o delle urine informi il medico che sta prendendo CEFIXIMA EG; la cefixima è infatti in grado di alterare i risultati di alcuni di questi esami.

CEFIXIMA EG può alterare i risultati di alcuni esami per la ricerca di glucosio nelle urine quali i test di Benedict o Fehling o le pastiglie di controllo a base di solfato di rame. Come nel caso di altre cefalosporine, CEFIXIMA EG può alterare i risultati di un esame per la rilevazione di specifici anticorpi nel sangue noto come test di Coombs diretto.

CEFIXIMA EG con cibi e bevande

CEFIXIMA EG può essere assunto con o senza cibo. Ingerisca ogni compressa intera con un bicchiere d'acqua.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Gravidanza

Altre sostanze appartenenti al gruppo di farmaci a cui appartiene cefixima sono ben tollerate durante la gravidanza.

Il medico deciderà se il beneficio della terapia supera il potenziale rischio per il suo bambino.

Allattamento al seno

La cefixima viene escreta in piccole quantità nel latte materno; chiedi al medico se può prendere CEFIXIMA EG durante l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

La cefixima può causare capogiri. Se questa manifestazione la riguarda, non guidi o usi macchinari.

3. COME PRENDERE CEFIXIMA EG

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Dosaggio

Il medico deciderà la dose corretta di CEFIXIMA EG e le dirà per quanto tempo dovrà assumere il medicinale. Prenderà tante compresse di CEFIXIMA EG quanto necessarie per trattare la sua condizione. Si attenga scrupolosamente alle istruzioni del medico e non modifichi mai il dosaggio di sua iniziativa. In caso di qualsiasi dubbio chiedi al medico o al farmacista la quantità di medicinale che deve prendere o quando deve prenderlo.

Dose abituale per adulti e adolescenti (12 anni di età o superiori)

La dose raccomandata per gli adulti è di una compressa di CEFIXIMA EG al giorno che può essere assunta come dose singola oppure in due somministrazioni suddivise (la compressa può essere divisa in dosi uguali).

1x400 mg al giorno come dose singola o

2x200 mg al giorno a intervalli di 12 ore.

Se il medico Le ha prescritto una dose giornaliera, la stessa dovrà essere assunta ogni 24 ore. Se il medico le ha prescritto di assumere il medicinale in due somministrazioni suddivise, prenda una dose ogni 12 ore. Il medicinale deve essere preso ogni giorno sempre alla stessa ora.

Bambini di età inferiore a 12 anni

CEFIXIMA EG non è raccomandato per i bambini. Chieda consiglio al medico per ulteriori informazioni.

Persone anziane

Per le persone anziane valgono le stesse dosi previste per gli adulti, fatto salvo che la funzione renale sia normale.

Problemi renali

Se ha problemi renali o è in dialisi, il medico ridurrà la dose.

Non sono disponibili dati sufficienti circa l'impiego di CEFIXIMA EG nei bambini con problemi renali. Non è pertanto raccomandato l'utilizzo di CEFIXIMA EG in questi pazienti.

Se prende più CEFIXIMA EG di quanto deve

Se assume per errore troppe compresse o le compresse di CEFIXIMA EG vengono inghiottite da un bambino, si rivolga immediatamente al medico o si rechi al Pronto Soccorso più vicino.

Se dimentica di prendere CEFIXIMA EG

Se dimentica di assumere una compressa, le prenda appena se ne ricorda. Se comunque mancano meno di 6 ore al momento della dose successiva, tralasci la dose mancante e prosegua con il suo dosaggio regolare. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.

Se interrompe il trattamento con CEFIXIMA EG

Non interrompa il trattamento prima del tempo. È importante che lei completi l'INTERO ciclo di trattamento per ridurre la possibilità che l'infezione si ripresenti.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Come tutti i medicinali questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Reazioni allergiche

Tutti i medicinali possono causare reazioni allergiche, anche se raramente in forma grave (può interessare fino a 1 persona su 1.000). Tra queste:

- improvvisa mancanza di respiro e senso di oppressione toracica;
- rigonfiamento delle palpebre, del viso o delle labbra;
- gravi eruzioni cutanee, anche in forma bollosa, che possono coinvolgere occhi, bocca, gola e genitali.

Tutte queste reazioni allergiche necessitano di assistenza medica urgente. Se ritiene che si stia verificando uno dei suddetti effetti indesiderati gravi, smetta di prendere questo medicinale e si rivolga immediatamente al medico oppure si rechi al più vicino Pronto Soccorso.

Sono stati segnalati anche i seguenti effetti indesiderati:

Comune (può interessare fino a 1 persona su 10):

- diarrea (in caso di diarrea grave o presenza di sangue nelle feci, interrompa l'assunzione del medicinale e si rivolga al medico immediatamente, perché può avere un'infezione molto rara del grosso intestino che necessita di un trattamento speciale).

Non comune (può interessare fino a 1 persona su 100):

- cefalea;
- nausea;
- vomito;
- dolore allo stomaco;
- eruzione cutanea;
- alterazioni dei test ematici indicativi della funzionalità epatica.

Raro (può interessare fino a 1 persona su 1.000):

- grave reazione allergica che causa rigonfiamento di viso o gola (edema angioneurotico);
- reazioni di ipersensibilità (si tratta di eruzioni cutanee meno gravi di quelle citate più sopra, orticaria, prurito);
- capogiri/vertigini;
- perdita di appetito (anoressia);
- flatulenza (aria);
- prurito;
- febbre;
- anomalo aumento del numero di cellule ematiche (eosinofili) caratteristico degli stati allergici;
- infiammazione delle mucose;
- infezioni ricorrenti di origine batterica;
- infezioni ricorrenti di tipo micotico.

Molto raro (può interessare fino a 1 persona su 10.000):

- formazione di vesciche o sanguinamento della cute intorno a labbra, occhi, bocca, naso e genitali. Sintomi simil-influenzali e febbre (sindrome di Stevens-Johnson);
- eruzioni cutanee bollose gravi in cui gli strati della pelle si possono staccare per lasciare grandi aree di pelle viva, esposta su tutto il corpo. Sensazione di malessere generale, febbre, brividi e muscoli doloranti (necrolisi epidermica tossica);
- reazione allergica grave con conseguenti difficoltà respiratorie o shock (shock anafilattico);
- infiammazione dell'intestino che si manifesta solitamente in seguito a trattamento antibiotico (colite associata ad antibiotici);
- grave riduzione del numero dei globuli bianchi con conseguente maggiore predisposizione alle infezioni (agranulocitosi);
- grave riduzione delle cellule ematiche con conseguente debolezza, comparsa di lividi o più probabile comparsa di infezioni (pancitopenia);
- riduzione del numero delle piastrine (piccole cellule) necessarie alla coagulazione del sangue con conseguente aumento del rischio di sanguinamento o lividi (trombocitopenia) (se, per qualsiasi ragione, Lei deve sottoporsi a un esame del sangue, informi la persona che Le sta prelevando il sangue che Lei si trova in cura con questo medicinale, poiché i risultati potrebbero essere compromessi);
- diminuzione dei globuli rossi con conseguente pallore cutaneo e debolezza o respiro corto (anemia emolitica);
- bassa conta dei globuli bianchi (leucopenia);
- reazione di ipersensibilità con sintomi come eruzione cutanea, dolore articolare, febbre e shock (malattia da siero);
- senso di irrequietezza associato ad un'aumentata attività (iperattività psicomotoria);
- infiammazione reversibile dei reni con effetto su struttura e funzione;
- infiammazione del fegato (epatite);
- disturbi biliari (ittero colestatico);
- alterazione di alcuni specifici test ematici indicativi della funzionalità dei suoi reni (aumento della creatinina ematica).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema

nazionale di segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. COME CONSERVARE CEFIXIMA EG

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione del medicinale. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

- Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
- Se il medico Le dice di interrompere il trattamento, restituisca il medicinale rimanente al farmacista che provvederà ad eliminarlo in modo sicuro.

6. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

Cosa contiene CEFIXIMA EG

Il principio attivo è cefixima: ogni compressa rivestita con film contiene 400 mg di cefixima corrispondente a 447.63 mg di cefixima triidrato.

La compressa contiene anche: calcio fosfato dibasico anidro, amido pregelatinizzato; cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra; magnesio stearato e Opadry bianco (Y-1-7000) e acqua purificata.

Le compresse sono rivestite con HPMC 2910/ipromellosa 5 cp (E 464), titanio diossido (E 171) e macrogol / PEG 400 (E 1520).

Descrizione dell'aspetto di CEFIXIMA EG e contenuto della confezione

Compresse rivestite con film di forma rettangolare modificata, di colore variabile da bianco a crema con parziale incisione su entrambi i lati. La compressa può essere divisa in dosi uguali.

Il medicinale è disponibile in:

Blister di Al/PVC/PVdC e in blister di Al/PVC-Aclar: 5, 7, 10 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio

EG S.p.A., Via Pavia, 6 - 20136 Milano

Produttori responsabili del rilascio dei lotti

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel (Germania)

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

BG	Zefacet 400 mg филмирани таблетки
DE	Cefixim STADA® 400 mg Filmtabletten
IT	CEFIXIMA EG 400 mg compresse rivestite con film

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 14 Ottobre 2015